

DE PROGNOSSI MEDICÆ

EX NECROLOGIS ERUENDÆ.

v. Prosper Alpinus de præſagendâ vitæ et mortis ægrorum

DISSERTATIO MEDICÆ.

Quam propugnabit ab octavâ ad meridiem in Auguſtiſſimo Monſpelienſi Apollinis fano, die 3.^o menſis Maii, anni 1762, JOSEPHUS GALTIER, Muratenſis, Diœceſis Caſtrenſis apud Occitanos, Liberalium Artium Magiſter, & jamdudùm Medicinæ alumnus.

Pro Baccalaureatûs gradu conſequendo.

IN Morbis acutis omnis prognofis ſivè ad ſalutem, ſivè ad mortem incertiffima eſt, *ut ait Hippocrates*, aſt in pluribus chronicis ſatis certa; ut autem tùm in illis, tùm in iſtis probabilitas promoveatur, nulla alia methodus tutior eſt quàm quæ ex ſœpiſſimè obſervatis eventibus, futuros in ſimilibus circumſtantiis & conditionibus per inductionem determinat.

Hanc autem futura præſagiendi methodum ſcientiæ nomen quoddam merituram fore haud dubium eſt, cum probabilitatem ipſam calculo ſubjicere jam cœperint egregii Mathematici, *Montmort*, *Bernoulli*, *Sgravesandius*, alique.

Verùm ad hujus ſcientiæ fundamenta neceſſarius eſt immenſus numerus obſervationum, quæ jam à duobus ferè ſæculis colligi cœpere, & quotannis in faſtis paræciarum tùm natalibus tùm emortualibus cumulantur.

Ex his invicem collatis eruditi viri confecerunt tabulas, in ſcriptis *Hallei*, *Kerſeboomii*, *Deparcieux* potiffimùm reperiundas, quarum partem in calce hujus opellæ apponere viſum eſt; ex quibus pro quâlibet ætate, quænam ſit ratio natorum & viventium ad mortuos, quænam proindè vitæ aut mortis probabilitas quiſque perſpicere valet; optandum certè foret ut in faſtis emortualibus Parochi non ſolùm nomen mortui, ejus ætatem, ſexum, mortisque diem ut aſſolent; verum etiam ut morbi ultimi nomen quoquomodo à parentibus datum, referrent, ut apud Anglos, Germanos & Batavos dudùm mos invaluit; aſt multò utiliùs ut in Tabulis à Medicis vaſta Noſocomia curantibus aut Studioſis ea inviſentibus, ægrorum quolibet menſe ingreſſorum, morbi nomine appoſito, numerus in primâ columnâ recen-

feretur, in alterâ sanati, in tertiâ mortui, in quartâ ad alterum mensura residui referrentur; atque anacephalæosis cujusvis mensis & anni termino adderetur. Hoc opus per aliquot annos continuatum plus prodesset quàm millena alia volumina.

Similem in se præsidis hortatu suscepit antè sex annos laborem egregius Medicus, qui indè Tabulas Nosologicas utilissimas confecit, quarum specimen lege pag. 9.

Ex his Tabulis 518 ægri, mensibus Junio & Julio anni 1757, Nosocomium ingressi sunt, quorum 25 intrâ hoc bimestre spatium obiit. Si post 10 vel 20 annos eadem ratio ægrotantium in Nosocomiis obviorum ad mortuos reperiretur, indè certum ferè esset in similibus circumstantiis vigesimam tantum partem morborum acutorum & chronicorum promiscuè in tali Nosocomio obviorum letho terminari. Quod certè nosse utilissimum foret ad prognosim; quod autem ad prognosim utile est, id ad praxim fructuosissimum censendum est. Nam, *ut innuit Hippocrates*, sive morbi salute terminandi sint, sive letho, nil gloriosius est Medico, quàm eventum initio prælagire, & simul ad curam rectè instituendam, nil est magis momentosum, quàm Historiam morbi seu ejus eventus prævidisse.

Sic in Variolâ cujus Historiam numerosis observatis fatis fidam nobis tradidit *Sydenhamius*, ex hâc futurorum eventuum cognitione quid agendum, quid non agendum initio ipso morbi prospicimus; in morbis è-contrâ novis, nondùm cognitis, seu quorum eventus ignoramus, *ipso fatente Sydenhamio*, primi saltem qui curæ Medici se committunt, maximè periclitantur.

In casibus fortuitis & æque possibilibus quorum determinatus est numerus, facilè determinatur possibilitas eventus fausti & infauti. Sic in ludo abaci in quo duabus tesseris utimur, quarum singulæ sex hedras punctis notatas gerunt & quorum punctorum in binis simul numerus ad 36 assurgit, quolibet harum tesserarum jactu, possumus 36 contrâ 1 deponere, certando fore ut talis vel talis combinatio eventura vel non eventura sit.

Verùm cum plurimæ simul ut in morbis circumstantiæ & conditiones interveniunt ex quibus eventus mirum in modum variare potest, non nisi ex millenis & millenis observationibus eventum faustum vel infautum possumus prælagire.

Tanta est vis observationis repetitæ, ut eventus qui in infinitis ferè casibus comperti sunt, præ certissimis apud omnes habeantur, licet nec revelatio, nec ulla demonstratio prognosim tueatur. Sic nemo sanus dubitat quin hancce diem altera subsequatur sit, quin ipse intrâ sæculum circiter moriturus sit &c. Atqui hæc certitudo solâ repetitâ observatione constat, & constat licet ignoremus causam redituræ lucis Solaris & adventuræ mortis, licet infinitæ sint circumstantiæ in singulis hominibus diversæ, quæ vitæ terminum possunt procrastinare.

Ex Tabulis *Kerfeboomii* numerus natorum quolibet anno in Populosis Provinciis unitis, quarum sunt 980000 incolæ, est 1 : 35

totius Populi. Numerus autem natorum in gentibus quæ vix emigrant, est circiter æqualis numero illorum qui annuatim moriuntur, si gens nec crescat, nec decrescat sensibiliter, undè ferè certò eruere possumus in Civitate singulis annis quemlibet 35^{um}. moriturum esse, & reciprocè ex numero funerum in datâ Urbe per 35 multiplicato, eruimus numerum habitatorum.

Vita media ea est quam quis probabiliter attinget; sic vita media recens nati est 25 annorum & 9 mensium, octogenarii est 4 ann. 7 mens., centenarii est 0.

Æ T A S.

Vita media seu spes probabilis vitæ crescit ab ortu ad annum quintum in quo est 38 ann. indè verò semper decrescit eundo, sed tardiùs; quippe anno 100. est 36 ann. 11 mens.; 150. est 33a. 9m.; 200. est 30a. 9m.; 400. 20a. 7m.; 600. 11a. 6m.; 700. 7a. 7m.; 900. 3a. 7m.; &c.

Tenacitas vitæ est eò major quò major est expectatio vitæ probabilis & quò ætas est provectior, seu est ut numerus ætatem exprimens, ductus in numerum quo vita ejus ætatis media exprimitur. Tricenarius seu qui 30^{um}. annum attingit victurus est probabiliter 25a. 6m., decennis verò triplò minùs annosus non expectare potest triplum hujus vitæ seu 76a. 6m., sed tantum circiter 37 annos; ergò tricenarii vita est ferè duplò tenacior quàm decennis.

Pari examine instituto evidens erit vitæ tenacitatem maximam esse à 100. ætatis anno ad 50^{um}. antea verò & postea minorem.

Indè verò quid ad Medicam prognosim consequatur, facile est eruere; scilicet multò feliciùs ominandum esse in morbis de cætero paribus, quo vitæ tenacitas est major, scilicet prognosim, in morbis recens natorum, ut plurimum esse infelicem, si cum prognosi Adulorum conferatur, infeliciorum verò prognosim de morbis eorum qui 70^{um}., 90^{um}. &c. annum ducunt, si par sit aliundè morbi genus & gradus.

Ut verò principium illud clariùs elucescat, quæ ex Necrologo parœciæ B. Virginis in hâc Urbe deduximus, referre juvat.

Ex 170 Infantulis antè duodecimum ætatis mensem defunctis, numeravi mortuos intrâ primum mensem ætatis, 92, à primo mense ad secundum, 11, à 20. ad 3^{um}., 8; à 30. ad 4^{um}. 4; & sic

Menses ætatis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92	12	8	4	5	5	4	15	10	12	4	0

undè colligitur primo mense multò & in hoc casu triente plures obiisse duobus primis ætatis mensibus quàm decem residuis, & primum mensem esse aliis longè funestissimum.

Ab anno 1739 ad 1744 in hâc parœciâ obiere 96 Infantuli uno anno minores, & ex illis ter decies plures obiere, primâ sui ortûs quàm aliâ quavis die, ergo dies funestissima est prima dies quâ nascimur.

Ex Tabulis ad calcem adjectis, quisque videre poterit, quid sentiendum de annis climactericis quos 49^{um}, 56^{um}, 63^{um} esse putat *Marsilius Ficinus*, cum neuter ex his æquè sit funestus ac primus ætatis annus, quippè ætatis anno 49^o. 1:46; 56^o 1:33; 63^o. 1:24 viventium fato fungitur, cum primo anno quarta pars moriatur. Primus itaque annus est sexies saltem periculosior 63^o.

Jam ut ad tempestates & menses deveniamus ex Illustrissimi Præsidis observationibus collatis cum illis quæ *Uratisviæ & Londini* institutæ sunt, in hâcce meridionali Regione, tempestates calidæ sunt paulò funestiores frigidis & è-contrà in Regionibus illis frigidis, frigidæ sunt pluribus funeribus insignes quàm calidæ; mortuorum scilicet ratio est

	Vere	Æstate	Autumno	Hyeme
Monspeli	390	597	407	352
Londini	307	286	287	286

ast fateor intrà tempus dictarum observationum viguisse Epidemias Variolosas quæ maximam stragem Julio & Augusto mensibus ediderunt.

In Nosocomio generali satis constanter observatur accedente frigore Hyemali plures senes quàm aliis tempestatibus è vivis excedere, & certè plures Infantes mensibus Æstivis quàm aliis Patriam Cælestem repetere soliti sunt. Undè propositio antecedens, frigus scilicet frigidis, fervorem calidis esse funestum, confirmari videtur; contrà quàm *Docuere Galenici*; dùm aiebant similia similibus conservari, nec mentem suam satis determinatè explicabant.

Mortalitas diversis anni mensibus respondens est his numeris expressa juxtà memoratas observationes ab anno 1744 ad annum 1751.

Januario	Februario	Martio	Aprili	Maiò	Junio
205	181	190	144	153	138
Quintili	Sextili	Septemb.	Octob.	Novemb.	Decemb.
181	199	199	206	168	196

Vita media diversorum locorum non ità quoad aëris temperiem discrepantium, maximè discrepat, & ut hæc pro Urbibus & Villis diversis determinetur, optandum est.

Ad hanc obtinendam inquiratur ab omnibus matribus obviis indiscriminatim, quot natos pepererint, quot menses vixerint qui jam obiere, quotum annum verò ducant cæteri; mensibus viventium & mortuorum addantur menses & anni quos viventes pro suâ ætate expectare debent, juxtà Tabulam inferiùs appositam, atque his tribus summis simul per numerum natorum omnium divisus, quotiens vitam mediam hujus familiæ exprimet; & si plurimarum Urbis familiarum vitæ mediæ addantur, atque per familiarum numerum dividantur; habebitur vita media tribùs, Urbis &c.

Eo modo Illustris Regiæ Scientiarum Societatis Monspeliensis Socius D. *Deparcieux* invenit vitam mediam in Villis Gebennensibus quibusdam

esse 41 annorum ; Lauduni apud Picardos 37 ; Lutetiæ verò 21 an. 4 mens.
 Exemplo fit Familia octo natis conflata , A, B, C, D, E, F, G, H.

FAMILIA

A hodie numerat	12 an.	0 mens	Vita media	41 an. 7 mens.
B.	10	4	42 9
C	8	8	43 11
D	7	6	44 2
E.	4	5	44 3
F. vixit	0	1	* *
G. vixit	0	7	* *
				<hr/>
				216. 8.
H obiit die ortus.	0	0		
				<hr/>
				43. 7.
				<hr/>
43 an.		7 men.	260. 3.	

Si summa vitarum præcedentium & mediarum 260 an. 3 mens. dividatur per numerum natorum 8 , quotiens dabit pro vitâ mediâ Familiæ 32 an. 6 mens. . . jam si ex decem Familiis summa vitæ mediæ sit cognita , hæc summa divisa per numerum Familiarum dabit in quotiente vitam mediam harum decem Familiarum & sic deinceps.

Ex his principiis posset deduci cur datæ Urbis incolæ sint vivaciores cæteris , conferendo mores , victum , aërem , temperiem , aliasque circumstantias. V. g. Londini , & in diversis Germaniæ ac Bataviæ magnis Urbibus , vita media est longior quàm Parisiis , quoniam in hisce Regionibus matribus suos natos lactare & sic accuratiùs eos custodire ; Parisiis verò mos est maximam partem Infantum , nutricibus exteris multò minùs sedulis credere , verosimile est plures incuriâ Matrum Infantes Parisinos quàm Germanos & Londinenses occumbere.

Reapse Parisiis numerus Baptismatum excedit numerum Funerum , atque compertum est 9000 Infantum Parisiis natorum , extra Urbem fato fungi singulis annis , quorum magna pars si nata foret in Villis & à Matribus suis educata viveret , major verò si in Villis in quibus vita media longior est , ob Præsidiorum sanitatis , ut aëris , cibi , potùs &c. præstantiam.

ARTIFICES,

Si quis Medicarum rerum curiosus , inquireret vitam mediam cuique vivendi modo & singulis artificibus propriam ; scilicet sedentariis , stantibus , rhedariis , cursoribus , agrifossoribus , nec-non viris diversarum conditionum , ut Medicis , jurisperitis &c. ; is certè non inutilem ad prognosim , imò Aitiologiam morborum , navaret operam. Facile crediderim operarios qui violenta exercitia tolerant , citiùs senescere & minùs longævos esse artificibus mediocriter se exercentibus , pauci sunt bajuli , fossores octogenarii. Vita Militum media , ratione periculorum quibus exponuntur , fortè brevior est quàm Monachorum.

Vita verò media in diversis vitæ generibus , computari debet ex ætate quâ illud vitæ genus amplexantur. Academici Parisini circiter inter 35 ann. &c

SOCIETATES

40^{um}. ætatis annum cooptantur, illorum verò numerus est inter 75 & 80, docet autem observatio quinque intra biennium è vivis excedere solitos esse, adeòque ex quadraginta hujus ætatis & fortis, 5 intra quadriennium morerentur & ex octo, pari passu, unus intra quatuor annos obiret, aut ferè 16, ab initio hujus sæculi, quod satis consonat, cum salubris Academiæ in quâ sunt octo Professores, Necrologo.

A Sancto Petro ad initium hujus sæculi 1700, numerantur 243 Summi Pontifices, diviso hoc tempore per horum numerum, exurgit vita media Pontificum Romanorum æqualis circiter 7 annis, vitâ mediâ septuagenarii paulò major.

Qui in Urbem è diversis Provinciis appellunt ut studio operam dent, sunt ut plurimum vegetiores quàm qui ex Patriâ vix recedere valent, ob infirmitates quibus nulla ferè est immunis numerosa Familia, atque sæpius ætatem ducunt inter 15^{um}. & 20^{um}. annum.

Cum autem juxtâ Tabulas D. Deparcioux ex 100000 hominibus 44948 ad 15^{um}. annum deveniant, ex istis verò à 15^o. ad 20^{um}. 1882 progrediantur; verosimile est ex 200 non nisi 8, intra 5an. & 4 vel 5 intra triennium obituros, quod ab experienciâ non recedit: dimidia verò pars temeritati suæ seù imprudentiæ illud infortunium imputandum habet, potiùs quàm morbis quos humana natura parùm cavere potest.

SEXUS.

Sexûs diversitas non exiguam in vitæ mediæ æstimatione secum importat differentiam, quam ex omnibus Necrologis eruere facile est; verùm aliis anteponimus fastos Parœciæ Sti. Sulpicii Parisiorum deductos ab anno 1715 ad 1745. Intra illos 30 annos baptismata masculorum fuere 35731, fœminarum 34069, seù ut 24 : 23.

Plures itaque nascuntur mares quàm fœminæ, sed vita fœminarum longitudine suâ compensat quod individuorum numero deficit.

Quotannis in hâc parœciâ numerus Baptismatum est ad numerum funerum ut 23 : 16, Monspeli ut 348 : 339, seù plures nascuntur, quàm in his Urbibus moriuntur, quia Infantes nutrîcibus exteris commissi, & Adulti multi peregrè profecti, extra Urbem Patriam fato cedunt; Londini verò dum 176 nascuntur, 268 in Urbe obeunt.

Ex 10333 qui intra primum annum moriuntur in Parœciâ Sti. Sulpicii sunt mares 5718, fœminæ 4615, seù ut 57 : 46.

A primo anno ad 5^{um}. ut 5925 : 6093.

A quinto ad 10^{um} ut 1597 : 1536.

Ergo ab ortu ad 10^{um}. annum mares unâ decimâ tertiâ parte vivaciores fœminis, si nulla habeatur numeri subjectorum ratio.

A 10^o. ad 20^{um}. annum plures mares moriuntur quàm fœminæ, quatenùs sunt reapse illis numerosiores, vivacitas itaque eadem est.

A 15^o. ad 20^{um}. obeunt 955 mares præ 927 fœminis.

A 20^o. ad 45^{um}. mares 31 pro 30 fœminis obeunt, licet graviditate & partu istarum plurimæ divexentur; sed solius sexûs respectu habito, & sequio-

7
ris minori numero, vix pauciores foeminae quam mares occumbunt, quod de Mulieribus seu conjugio vincit verum non est.

Quoniam vero in summa paulo pauciores obeunt foeminae in Adolescentia quam mares, plures foeminas post sexagesimum annum & in pro-
vectiori aetate, praeviribus obituras esse consequens est.

Ante sexagesimum scilicet plures obeunt mares quam foeminae, etiam in majori ratione quam individuum numeri, seu quam 24: 23; ast post 60^{um}. fortuna mutatur illico & plures respective foeminae moriuntur.

Sic a 60^o. ad 70^{um}. aetatis annum, dum obeunt 3941 mares, 4668 foeminae recedunt, & ab anno 70^o. ad 100^{um}. praeviribus, 8391 foeminae eripiuntur.

Denique ultra saeculum ex 100000 hominibus sicut masculina sunt 57 & foeminae 107, in summa itaque ante sexagesimum annum plures masculi, post illum terminum tantum plures foeminae, fato funguntur.

Verum diversa conditio in hisce diversitatem affert, quippe in utroque sexu, vel Caelibes sunt vel Coniuges aut Vidui, alii Saeculari, alii Monasticae vitae addicti & diversa est in diversis conditionibus vita media.

Intra 30 annos Sepeliebantur Parisiis in Parochia memorata.

CONIUGIUM.

17578 Filii, 5079 Mariti, 1416 Vidui.

15118 Filiae 5413 Maritae, 3936 Viduae.

Plures itaque sunt Filii quam Filiae in Urbibus Populosis, plures Maritae quam Mariti, qui Peregrinantur aut Militant, dum Maritae domi remanent, & ferè triplum plures Viduae quam Vidui, eadem ratione absentes, & quorum plurimi in juventute obierunt, dum Viduae multum senescunt.

A 20^o. aetatis anno ad ultimum senium obire.

3552 Filii, 5076 Mariti, 1416 Vidui, summa . . . 11044 mares.

2172 Filiae, 5367 Maritae, 3935 Viduae, summa . . . 11474 foeminae.

A 90^o. aetatis anno ad 100^{um}. obire.

6 Filii, 8 Mariti, 35 Vidui.

1 Filia, 1 Marita, 105 Viduae.

Ex his intelligitur infra 30^{um}. annum, praeviribus masculis obire 15 foeminas innuptas, sed numerus absolutus masculorum vix excedit 1: 18^a. parte numerum foeminarum; ergo Filiae sunt paulo vivaciores Filiis intra hanc aetatem.

Intra hanc aetatem praeviribus 50 Maritis obeunt 54 Maritae, ergo ob partus, verosimillimè plures hac aetate obeunt foeminae quam Mares 1: 12^a. parte.

Verum si computemus funera Maritorum & Maritarum, a 20^o. aetatis anno ad 60^{um}; inveniemus priora 2749, posteriora 3914; quia haud dubiè eadem aetate Mulieres, a graviditate, partu, & sequelis partuum ac suppressionis catameniorum plus patiuntur quam Mariti, quorum pauci belli pericula subeunt. Unde sequitur hac aetate 1: 3^a. parte plures mori Mulieres quam viros uxoratos.

Inter foeminas, quae virginitati libant, citius moriuntur quam connubio

uinctæ; præ 14 filiabus 90^{um}. ætatis annum attingentibus fuere 112 uxores, ferè octies plures.

Alio etiã respectu connubium vivacitati favet, quippè præ sex filiis qui 90^{um}. annum attigere, fuere 43 Mariti aut vidui, adedque septies plures.

CÆLIBATUS.

Cum numerus cælibum fuerit ad numerum Maritorum aut Viduorum in dictâ Parœciâ, ut 32696 ad 15844, ferè duplus; facilè probatur quindicies plures cælibes quàm uxoratos ad senium seù ad 90^{um}. annum & ultrâ devenisse.

MONACHI.

Vita media Religiosorum vulgò censetur longior quàm sæcularium, sed falsò; *Illustris Deparcieux*, qui Necrologos plurimorum Monachorum, minimè Pauperum, evolvit, invenit equidem nostris temporibus paulò breviorẽ vitã mediã cæterorum hominum. Verum tamen ex 78 vel 80 Monachis à 16^o. ad 20^{um}. ætatis annum admittis non nisi duo singulis annis moriuntur. Moniales verò multò minùs periclitantur à 20^o ad 60^{um}. ætatis annum quàm Mulieres seù Maritæ, quod evincit à partibus & graviditate potissimùm, circà 50^{um}. ætatis annum, pendere Maritarum mortalitatem majorem.

Vulgò creditur non pauciores eã de causâ obire Mulieres quàm in præliis Milites, intereã tamen juxtã observata *Grauntii in Actis Londinensibus anno 1666*; ex puerperio vix 1:100^a. Mulier moritur.

MORBI.

Et cum ad morbos devenimus, dolemus maximè quòd cum tam facilis sit observatio in nosocomiis populosis circã genera morborum, eorumque eventus faustos & infastos: nemo tamen eam in se susceperit, præter Ill. D. *Razous* Medicum Nemausensem, Doctorem Monspeli & Regiæ Societatis Scientiarum Correspondentem.

Quid obstat quòminùs ex Nosocomiorum fastis eruantur numeri ægrorum ingressorum, & ex illis seorsim salvorum, mortuorum &c. quorum omnium Acta scribi solemne est; quæ facta sunt potiora paucis exponam.

Ex Peste augustæ vindelicorum, quo tempore non nisi 1400 nati sunt, 13000 obierunt, seù quarta civitatis pars anno 1535.

Alesiæ verò anno 1721, non tantas strages Pestis edidit, quippè, intrã annum, 320 cives abstulit & intereã 322 nascebantur, eratautem Civitas conflata circiter decem millibus hominum, quorum 1:31^a. pars obiit, ut extrã Pestem 1:35^a. & nascebatur & moriebatur. Pestis verò mortalitatem repressere ordo eximius in Urbe servatus, victûs abundantia & Medicorum peritia.

Ex abortu vel dystociã vix 1:20 natorum pars;

Ex morbis convulsivis . . . 1:5.

Ex odontalgia dentitionis 1:20.

Ex hæmoptysi, phthisi, amphimerinã hecticã . . . 1:5.

Ex morbis inflammatoriis, febribus acutis . . . 1:50.

Ex ascite, hydrothorace propèmodum 1:50.

Ex senili facto juxtã *Grauntium* 1:60.

Verùm juxta D. Deparcieu ex 100000 hominum, 164 seù 1: 600 centena-
rim annum, & 252 seù 1: 400 nonagesimum-quintum, superant, illos verò
senili fato obire verosimilè est.

Multò certiores numeri inquirendi sunt ex numerosis Tabulis Nosolo-
gicis, quæ sequenti methodo ordinandæ.

TABULA NOSOLOGICA

Mens. Junii, Julii & Octobris anni 1752 à D. RAZOUS.

Classes,	Genera,	Ægri,	Sanati,	Mortui,	Residui,
Vitæ 4	Herpes	2	2	0	0
	Anthrax	1	0	1	0
	Aneurisma	1	0	0	1
Febres 396	Ephemera exten.	145	136	2	7
	Synochus	106	86	1	19
	Typhus	7	5	1	1
	Amph. vel Tritæophia	60	51	5	4
	Quotid. Tert.	78	62	1	15
Phlegmasiæ 104	Pleuritis putris	60	33	11	16
	Peripneumonia putris	8	5	2	1
	Phrenitis	7	6	0	1
	Cynanche	2	1	1	0
	Gastritis	1	0	1	0
	Rubeola	22	21	9	1
	Scarlatina	1	1	0	0
Erysipelas	3	3	0	0	
Dolores 52	Ophthalmia	6	5	0	1
	Rheumatismus	36	32	0	4
	Hepatalg. ac Splenalg.	10	10	0	0
Vesaniæ 1	Hydrophobia	1	0	1	0
Anhelationes 4	Asthma	1	0	0	1
	Pleurodyne	3	3	0	0
Convulsiones 2	Hysteria	1	0	1	0
	Epilepsia	1	0	0	1
Comata 1	Catalepsis	1	1	0	0
Fluxus 44	Menorrhagia	1	0	1	0
	Dysenteria	28	19	0	9
	Diarrhœa	13	13	0	0
	Vomitus habitualis	2	1	0	1
Cachexiæ 30	Phtisis	11	1	2	8
	Ascites	11	1	4	6
	Ischuria	1	1	0	0
	Scorbutus	4	4	0	0
	Aurigo	3	3	0	0
		638	506	35	97

sunt in hac Tabulâ residui legitimi 57, cæteri in intervallum Julii & Octobris abeunt quorum exitum ignoramus.

Ex hac Tabulâ sequitur, ex 600 circiter ægris in Nosocomio obviis, 500 sanari intrâ menses duos, 35 vel 40 mori, & 50 vel 60 remitti ad aliud tempus.

Sequitur etiam morbos cæteris frequentissimos in Nosocomiis Militaribus ac civicis quale est *Nemausense*, esse 1°. Febres, 2°. Phlegmasias, 3°. Dolores, 4°. Fluxus, 5°. Cachexias.

Febres sunt ad cæteros omnes morbos chronicos ut 2 ad 3, sic sentiente *Sydenhamio*.

Acuti morbi Pyretici, ut Febres & Phlegmasiæ simul obvii, sunt ad cæteros morbos ut 3 ad 1, circiter triplò frequentiores in Nosocomiis.

Juxtâ hanc Tabulam classes perniciosiores sunt illæ, in quibus plures sunt mortui, respectu ægrorum numeri.

Febres auferunt 1: 40 febricitantium intrâ duos menses.

Cachexiæ 1: 6 intrâ idem tempus & diù durant adeòque demùm omnes ægros auferunt.

Phlegmasiæ 1: 7 intrâ hoc spatium eripiunt, sed citiùs etiam hoc spatio desinunt.

Dolores sunt omnium minimè funesti, licet meritò exôsi.

Convulsiones chronicæ innocuæ ferè quoad vitam, ast acutæ funestissimæ.

Vesaniæ, Comata, Convulsiones chronicæ, Anhelationes, raro Nosocomiis immorantur, & ad Morotrophia vel Orphanotrophæa dimittuntur.

Sic concinnari potest Tabula Nosologica, primæ columnæ apponenda nomina classium aut ordinum, secundæ generum ac si fieri potest specierum, tertiæ ægrorum ingressorum numerus, quartæ numerus sanatorum, quintæ mortuorum, sextæ residuorum in mensem subsequentem, septimæ observationes Practicæ, potissimùm characteres speciem morbi determinantes, aut methodum curatorium adhibitam declarantes, aut exitus morbi modum diversum ostendentes: v. g. ex pleuriticis sanatis, tot sudoribus, tot anacatharsi potissimùm sublevati; ex mortuis, tot suffocati, tot suppurati, tot in Phtisicos mutati &c; quoad methodum annotari debet, an methodus *Sydenhamiana*, an *Lobbiana*, an *Sthaliana* &c. adhibita fuerit, & quo successu; intrâ quot dies faustus vel infautus e venerit. Cùm autem in Actis Nosocomii numerus ægrorum & mortuorum quotis mensibus consignetur à curatoribus, ex his sua computa probare & corrigere poterit Medicus, adeòque omnis error vitabitur.

Si per decem annos in Populosis Nosocomiis hic labor exanthlaretur, publicique juris fierent hæ Tabulæ Nosologicæ, spes est fore ut plus intrâ hoc spatium progredieretur Ars Medica quàm antea intrâ sæculum.

In Parœciâ B. Virginis anno 1746 invenit D. Præses numerum Infantum decem tribus minorum, qui obiire tempore Epidemiæ Variolosæ, superasse numerum Infantum ejusdem ætatis, qui per decennium prægressum obiire quotannis consueverant, & excessus ille ad 250 circiter ascendebat;

Undè concludere est probabiliter hos 250 variolâ obiisse. & cùm inquisivisset quot Infantes intrâ primum, quot intrâ secundum, tertium &c. ætatis suæ annum mortui essent, invenit

Ab	ortû	ad	1 ^{um} . annum	26	mortuos.
A	. . . 1 ^o .an.	ad 2 ^{um}	42
A	. . . 2 ^o	ad 3 ^{um}	48
A	. . . 3 ^o	ad 4 ^{um}	48
A	. . . 4 ^o	ad 5 ^{um}	36
A	. . . 5 ^o	ad 6 ^{um}	19
A	. . . 6 ^o	ad 7 ^{um}	25
A	. . . 7 ^o	ad 8 ^{um}	6

Cùm veròsimillimum sit horum maximam partem Variolâ, ejusvè sequelis, mensibus Augusto & Septembri, obiisse. jure concludo in hâc Epidemiâ & nî fallor in cæteris Variolis, majus multò esse mortis periculum intrâ 3^{um}. & 4^{um}. annum constitutis, quàm junioribus aut annosioribus; ita ut octies plures ætatis anno 3^o. vel 4^o. moriantur quam anno ætatis 7^o.; quare verò á 6^o. ad 7^{um}. annum 25 obierint, cùm antecedenti 19 & subsequenti 6 tantùm defuncti fuerint, hoc tribuendum videtur Odontalgix dentitionis, tunc ut plurimùm concurrenti. Ita & verosimilè est primo ætatis anno numerum mortuorum crevisse, quia Infantuli illi multò pluribus morbis hâc ætate sunt obnoxii, quàm annis subsequentibus. Undè Variola accedens eos faciliùs eripit.

Indè verò generosi illi Medici, qui hætenùs felicissimè Variolam septennibus aut Adultioribus inseverunt, & millenos in Angliâ, Italiâ, Helvetiâ morti eripuerunt, caveant ne tam utilem operationem adhucdùm tentent in ætate trium vel quatuor annorum, ne infametur auxilium quod multis saluti fuit, pluribusque futurum est, si tandem Parentes in nostrâ Regione aures salutaribus monitis præbere non recusent: cùm verò semel præjudicia plebis hâc de re superata fuerint, tantò utilior erit generi humano Inoculatio, quantò in teneriore ætate fuerit instituta, cùm spes sit fore ut morti eripiat portentosum illum victimarum numerum, qui antè septennium Variolæ succumbit: in ultimâ quippè hujus morbi Epidemiâ, juxtâ calculum ab egregio Doctore D. *Coulas* institutum, dimidia fere pars Variolosorum huic morbo succubuit *Monspeli*. In Nosocomio verò inoculationis apud Londinenses ex 593 inoculatis, intrâ 4 annos, unicus obiit, & constat quòd citrà Variolam, ex Infantum quadriennium 100000, obeant intrâ annum 5614, adeoque intrâ mensem, seu spatium inoculationi destinatum circiter 4667, & proportionaliter ex 593, duos vel tres intrâ 15 dies, saltem unum, mori ferè necessum sit. Illius itaque mors inoculationi vix est imputanda, cui aliorum salus majori jure tribuenda est.

Ex illis quæ hætenùs exposuimus, quàm multa Corollaria eruere pronum est, suffecerit annotasse ex Tabulis Nosologicis, si quondam ad plures annos promoverentur; nec non ex Necrologicis, si accuratiùs investiga-

rentur & nomen morbi adderetur, maximam lucem in prognosi Medicâ affulsuram esse; numquid periculum in dato morbo est proportionale mortalitati ætatis, sexûs, Regionis, temperamenti, victûs rationis, vitæ fortis, tempestatis, Epidemiæ? nonne etiam respondet morbi generi, speciei, ejusque gradui & intensitati?

Verùm hujus-ce multiplicis periculi accurata æstimatio repeti debet ex similibus Tabulis, & hæc æstimatio summi est in Arte Medicâ momenti, ergo has-ce Tabulas elaborare & perficere qui tentaverit, de humano genere & Medicorum ordine optimè meriturus est.

Ad verum in rebus Medicis & Physicis assequendum, duæ viæ patent, altera à priori, quæ à causis cognitis ad effectuum cognitionem nos ducit; altera à posteriori, quæ ex repetitis observationibus, similes eventus in similibus circumstantiis præfagit: utraque Medicis utilis est, posterior nondùm satis exulta, nondùm fundamentis satis firmis superstructa.

Scientia probabilitatum, seu Ars conjectandi in Medicinâ faciendâ haud dubiè magnam lucem fœneratura est; cùm, velint nolint Medici, felicitas praxeos ex accuratiori & solidiori conjecturâ dependeat; non secùs ac fortuna illorum Mercatorum qui opes suas mari committunt, aut qui aliorum naves constituto pretio spondent, eò melior evadit, quò in Arte conjectandi peritiores sunt. Qui enim accuratiùs nôrunt quota quæque navis, datum iter exequendo, à multis retrò annis perierit; ut v. g. centesima quæque, illi minùs multò periclitantur & sortem tutiùs experiuntur, quàm qui horum omnium eventuum & calculorum ignari, simile commercium suscipiunt.

Liceat itaque hujus Artis, in Tyronum gratiam, prima elementa aliquot exemplis & definitionibus illustrare.

Morborum potissimi eventus quos præscire maximè necessarium aut utile est Medicis, sunt faustus, scilicet salus, & infautus, seu mors ægrotantium; ex quantocumque numero subjectorum eodem morbo ægrotantium, tot vel evafuros vel obituros esse certum est quot sunt ægrotantes. Ponamus hunc numer. — 100. si quàm maximus fuerit observationum de eventibus dati morbi numerus, ut 100, 1000, quàm maxima erit & velut absoluta certitudo Physica praxi sufficiens.

Si ex 1000 v. g. phtisicorum numero constet ne unum quidem evasisse, *Titium* vel *Mevium* deindè simili morbo, in similibus circumstantiis, obituros esse Physicè certum est; non secùs ac si eum evadere Physicè impossibile foret.

Certitudo eventûs est cognitio impossibilitatis eventûs contrarii.

Probabilitas eventûs est cognitio ejus eventûs possibilitatis; cognoscimus autem eventum esse possibilem, quoties in similibus circumstantiis quæ eum variare possunt, idem olim accidit. Si ex millenis ægris dato morbo laborantibus, unus, duo, tres &c. tantùm evaserint, est 1^{us}. 2^{us}. 3^{us}. gradus possibilitatis eundem eventum aliàs occursum.

Quò numerus ille minor est toto, seù summâ omnium casuum æque possibilium, eò probabilitas est minor.

Probabilitas minima est mera ignorantia eventûs: sic si unus millesimus, vel centesimus tantùm ex dato morbo convaluerit, ignoro ferè omninò, utrùm *Titius* hoc laborans evasurus sit.

Probabilitas vocatur *dubitatio*, vel *semi-certitudo*, si numerus casuum faustorum est æqualis dimidiæ parti numeri omnium casuum possibilium: sic si 500 ex 1000 ægris revaluerint, dubia est prognosis fausta de *Titio* proferenda, seù pari jure certandum est, eum vel moriturum vel evasurum.

Probabilitas vocatur *verisimilitudo*, si numerus casuum faustorum superet dimidiam partem omnium casuum; sic si ex 1000 ægris, 800, 900 evaserint; verosimile est *Titium* cum sanitate in gratiam rediturum, atque major est vel minor verisimilitudo, prout propiùs à dimidio ad totum accedit.

Hinc concludere fas est, errare eos, qui ex possibilitate phænomeni, aut ejus principio cognito, ejus existentiam inferunt, ut qui dicunt: *hoc fieri concipitur, ergo fit; vel hoc fieri debet, ergo fit.* Cùm cognitio possibilitatis simplicis, seù minimus gradus probabilitatis, ab ignorantia minimè distinguatur, ex cognito principio morbi, ejus tantùm possibilitas habetur; ad existentiam verò inferendam necessaria est ejus causæ cognitio, si desit observatio.

Probabilitas eventûs est, ut numerus casuum in quibus propositus eventus locum habet, ad numerum casuum omnium possibilium.

Si eventus propositus pendeat ab aliis eventibus fortuitis, seù qui non evidentè dependent à causâ determinatâ, probabilitas eventûs est, ut factum ex probabilitatibus singulorum.

In morbis eventus variat prò diversis effectibus Medicamentorum, ægrî voluntario regimine, Pharmacopolæ fide, Medici peritiâ, sedulitate, &c. utcùmque verò illi singulares eventus fortuiti sint, non minùs certò de eventu fausto vel infausto pronuntiare potest, qui magnum similibus casuum numerum ex Tabulis Nosologicis cognoscit.

Prudens dicitur Medicus, qui, in Arte conjectandi sive innatâ, sive acquisitâ, versatus, omnes circumstantias, quibus mutari potest eventus morbi, attentè circumspiciens & trutinans, futuros eventus prospicit & rariùs à vero aberrat.

Ad prudentiam itaque Medicam requiritur scientia Artis conjectandi; in eâ exercitatio, circumspectio, cognitio influxûs causarum, principiorum, circumstantiarum, in datum eventum & horum energiæ accurata æstimatio.

Si ex casibus fortuitis, alii sint faciliores cæteris, probabilitas eventûs crescit; ut facilitas casuum quibus similem alium expectamus; sed casus magis possibiles cæteris, sæpiùs eveniunt, adeòque ex numero casuum, in quibus datus eventus accidit, eam possibilitatem eruimus.

Utinàm aliquandò liceat cuique morbi speciei gradum probabilitatis

fausti vel infausti successus assignare, quod ex Nosologicis Tabulis expectandum esse putamus.

SCALA PERIODI HUMANÆ VITÆ EXHIBENS NUMERUM
viventium & morientium cum vitâ mediâ in singulis ætatibus.

D. Kerseboomii.

Anni ætatis	Numer. vivent.	Numer. mort.	Vita media ann. mens.	Anni ætatis.	Numer. vivent.	Numer. mort.	Vita media ann. mens.
0	1400	275	34 . 6	48	530	12	20 . 7
1	1125	50	41 . 9	49	518	11	20 . 0
2	1075	45	42 . 8				
3	1030	37	43 . 6	50	507	12	19 . 5
4	993	29	44 . 2				
5	964	17	44 . 5				
6	947	17	44 . 3	51	495	13	18 . 10
7	930	17	44 . 0	52	482	12	18 . 4
8	913	9	43 . 9	53	470	12	17 . 10
9	904	9	43 . 3	54	458	12	17 . 3
10	895	9	42 . 8	55	446	12	16 . 9
11	886	8	42 . 2	56	434	13	16 . 2
12	878	8	41 . 7	57	421	13	15 . 8
13	870	7	40 . 11	58	408	13	15 . 2
14	863	7	40 . 3	59	395	13	14 . 7
15	856	7	39 . 7	60	382	13	14 . 1
16	849	7	38 . 11	61	369	13	13 . 7
17	842	7	38 . 3	62	356	13	13 . 1
18	835	9	37 . 7	63	343	14	12 . 7
19	826	9	36 . 11	64	329	14	12 . 1
20	817	9	36 . 3	65	315	14	11 . 7
21	808	8	35 . 7	66	301	14	11 . 1
22	800	8	35 . 0	67	287	14	10 . 7
23	792	9	34 . 5	68	273	14	10 . 1
24	783	31	33 . 10	69	259	14	9 . 7
25	772	12	33 . 3	70	245	14	9 . 2
26	760	13	32 . 8	71	231	14	8 . 8
27	747	12	32 . 1	72	217	14	8 . 2
28	735	12	31 . 6	73	203	14	7 . 9
29	723	12	31 . 0	74	189	14	7 . 3
30	711	12	30 . 6	75	175	15	6 . 10
31	699	12	30 . 1	76	160	15	6 . 5
32	687	12	29 . 8	77	145	15	6 . 0
33	675	10	29 . 3	78	130	15	5 . 8
34	665	10	28 . 10	79	115	15	5 . 4
35	655	10	28 . 4	80	100	13	5 . 0

Anni ætatis.	Numer. vivent.	Numer. mort.	Vita media ann. mens.	Anni ætatis.	Numer. vivent.	Numer. mort.	Vita media ann. mens.
36	645	10	27 . 10	81	87	12	4 . 9
37	635	10	27 . 3	82	75	11	4 . 5
38	625	10	26 . 8	83	64	9	4 . 1
39	615	10	26 . 1	84	55	10	3 . 8
40	605	9	25 . 6	45	45	9	3 . 4
41	596	9	24 . 10	86	36	8	3 . 1
42	587	9	24 . 2	87	28	7	2 . 10
43	578	9	23 . 6	88	21	6	2 . 7
44	569	9	22 . 11	89	15	5	2 . 5
45	560	10	22 . 4	90	10	3	2 . 2
46	550	10	21 . 9	91	7	2	2 . 0
47	540	10	21 . 2	92	5	2	1 . 9
				93	3	1	1 . 6
				44	2	1	1 . 0
				95	1	1	0 . 6

NUMERO MORTUORUM SUPPOSITO = 100000.


quot sint mortui ex quavis ætate.

Ætates	Mares	Fœminæ	Summa
Antè <i>1^{um}</i> annum	16132	14178	30610
Inter 1 & 3	5863	5956	11819
Inter 3 & 5	2823	2791	5614
Inter 5 & 10	2485	2415	4900
Inter 10 & 15	1085	1024	2109
Inter 15 & 20	955	927	1882
Inter 20 & 25	1191	1052	2243
Inter 25 & 30	1223	1171	2394
Inter 30 & 35	1266	1359	2625
Inter 35 & 40	1158	1104	2262
Inter 40 & 45	1468	1363	2831
Inter 45 & 50	1306	1116	2422
Inter 50 & 55	1599	1385	2984
Inter 55 & 60	1554	1467	3021
Inter 60 & 65	1737	2254	3991
Inter 65 & 70	1754	2414	4168
Inter 70 & 75	2079	2919	4998
Inter 75 & 80	1500	2166	3666
Inter 80 & 85	1083	1813	2896
Inter 85 & 90	601	961	1562
Inter 90 & 95	212	375	587
Inter 95 & 100	95	157	252
Ultrâ centesimum	57	107	164
	49326	50674	100000

Periculum est mali futuri probabilitas.

Perceptio hujus probabilitatis, si jacturam nostrorum bonorum respiciat, ut jacturam, visus, auditus, vitæ &c., averfationem quandam, sive sensitivam, sive rationalem, habet comitem, quæ vocatur *Metus*; & ille metus, si rationalis sit, eò major est, quò malum gravius, adventus propior, probabilitas major.

Sed hæc de Logicâ probabilium Arti Medicæ applicatâ sufficiant.



ARGUMENTABUNTUR.

R. R. D. D. PROFESSORES REGII.

R. D. JOANNES-FRANCISCUS IMBERT, *Cancel-
larius & Judex.*

R. D. HENRICUS HAGUENOT, *Decanus.*

R. D. ANTONIUS FIZES, *Pro Decanus.*

R. D. FRANCISCUS DE SAUVAGES.

R. D. FRANCISCUS DE LAMURE.

R. D. GABRIEL-FRANCISCUS VENEL.

R. D. CAROLUS LE ROY.

R. D. PAULUS-JOSEPHUS BARTHE'S.

MONSPELII,
Apud AUGUSTINUM-F. ROCHARD, Regis & Universitatis Typographum
unicum 1762.